

Mit barn skal opereres:

Før operationen:

Det er vigtigt, at barnet føler sig trygt. Du kan forberede det ved at fortælle, hvad der skal ske. Bamse og sut må gerne medbringes under operationen.

Barnet skal være fastende for mad, tyggegummi, mælk (og mælkeprodukter) og juice i op til 6 timer før operationen.

Barnet må gerne få lidt saftvand eller vand indtil 1 time før operationen.

Barnet må ammes indtil 3 timer før operationen og få modermælkserstening indtil 4 timer før operationen.

Tager barnet inhalationsmedicin, skal det tages om morgenen før operationen.

Ved afbud/sygdom kontaktes klinikken på tlf 59440535 (kl 8-12). Hvis det er på selve operationsdagen kontaktes klinikken på 61140521.

Under operationen:

Barnet opereres i fuld narkose, der foregår ved klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Du kan være ved dit barn, indtil det falder i søvn og igen, når det vågner. Indgrebet varer ca 30 min.

Efter operationen:

Det er en god ide at have en ekstra ledsager med til hjemtransporten. Vent med at give barnet mad og drikke indtil I er kommet hjem.

DRÆN I ØRERNE:

Drænet skal sikre afløb fra mellemøret.

Barnet vil som oftest være frisk og fri for smerter, når I er kommet hjem efter operationen og har fået mad og en lille lur. Ved smerter gives panodil efter barnets vægt. Der kan komme lidt gulligt eller blodigt flåd fra ørerne de næste par dage.

Dette er helt normalt og kan tørres væk med en fugtig klud fra det ydre øre. Ved flåd, der varer mere end 2 dage, kontaktes klinikken.

Der foretages en postoperativ kontrol 2-3 uger efter indgrebet, hvor der samtidig tages stilling til, om barnet må gå i svømmehal. herefter vil der være dræn-kontrol hver 6. mdr eller efter behov.

Drænet falder som regel ud af sig selv efter gennemsnitligt 8,9 mdr.

Barnet må komme i institution/skole dagen efter.

Polypper/ reduktion af mandler:

Barnet skal have en panodil stikpille eller mixtur panodil 2 timer FØR operationen.

Se den anbefalede dosis på pakken.

Barnet kan have lidt ubehag i svælget de første dage efter indgrebet. Det kan lindres med is og evt. blød kost.

Der kan komme efterblødning. Blødningen standser oftest på at barnet sutter på en is eller isterning. Man sætter desuden barnet op, så blodtrykket falder mest muligt i hoved/halsområdet og agerer roligt. Ved blødning kontaktes ørelægen eller vagtlægen udenfor almindelig arbejdstid. Ved styrtblødning ringes 112.

Barnet kan komme i skole/ institution efter weekenden.

Hvis barnet er under 4 år gammelt tilråder vi, at forældre sover med barnet de første 4-5 dage efter operationen.

Med venlig hilsen

Øre-, næse- og halsklinikken
v. speciallæge Lena Egelykke Jørgensen
Ahlgade 63, 1. th.
4300 Holbæk
59440535