

Mit barn skal opereres:

Før operationen:

Det er vigtigt, at barnet føler sig tryk. Du kan forberede det ved at fortælle, hvad der skal ske.

Patienten skal være fastende for mad, tyggegummi, mælk (og mælkeprodukter), juice og rygning i op til 6 timer før operationen.

Børn over 12 år og voksne må gerne få lidt saftevand eller vand indtil 2 timer før operationen.

Tager patienten inhalationsmedicin, skal det tages om morgenen før operationen. Ved afbud/sygdom kontaktes klinikken på tlf 59440535 (kl 8-12). Hvis det er på selve operationsdagen kontaktes klinikken på 61140521.

Under operationen:

Operationen foretages i fuld narkose, der foregår ved klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Du kan være ved dit barn, indtil det falder i søvn og igen, når det vågner. Indgrebet varer ca 30 min.

Efter operationen:

Det er en god ide at have en ekstra ledsager med til hjemtransporten. Vent med at give patienten mad og drikke indtil I er kommet hjem.

DRÆN I ØRERNE:

Drænet skal sikre afløb fra mellemøret.

Patienten vil som oftest være frisk og fri for smerter, når I er kommet hjem efter operationen og har fået mad og en lille lur. Ved smerter gives panodil efter vægt/doseringsvejledning på pakningen. Der kan komme lidt gulligt eller blodigt flåd fra ørerne de næste par dage. Dette er helt normalt og kan tørres væk med en fugtig klud fra det ydre øre. Ved flåd, der varer mere end 2 dage, kontaktes klinikken.

Der foretages en postoperativ kontrol 2-3 uger efter indgrebet, hvor der samtidig tages stilling til, om patienten må gå i svømmehal. Herefter vil der være dræn-kontrol hver 6. mdr eller efter behov.

Drænet falder som regel ud af sig selv efter gennemsnitligt 8,9 mdr.

Patienten må komme i institution/skole dagen efter.

Polypper/ reduktion af mandler:

Patienten skal have en dosis panodil, svarende til vægten 2 timer FØR operationen. Se den anbefalede dosis på pakken.

Patienten kan have lidt ubehag i svælget de første dage efter indgrebet. Det kan lindres med is og evt. blød kost.

Der kan komme efterblødning. Blødningen standser oftest ved at patienten sutter på en is eller isterning. Man sætter desuden patienten op, så blodtrykket falder mest muligt i hoved/halsområdet og agerer roligt. Ved blødning kontaktes ørelægen eller vagtlægen udenfor almindelig arbejdstid. Ved styrtblødning ringes 112.

Patienten kan komme i skole/ institution efter weekenden.

Med venlig hilsen

Øre-, næse- og halsklinikken
v. speciallæge Lena Egelykke Jørgensen
Ahlgade 63, 1. th.
4300 Holbæk
59440535